

アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」 アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」

1 日投与量体重別早見表

| 体重 | 1 日 1 回投与量 | | | 体重 |
|------|------------|--|-----------------------------------|------|
| | 細粒 (バラ) | 細粒 (分包) | カプセル | |
| 6kg | 0.6g | 体重 15kg 未満の患児には「細粒小児用10%」のバラ包装をご処方ください | 体重 15kg 未満の患児には「細粒小児用10%」をご処方ください | 6kg |
| 7kg | 0.7g | | | 7kg |
| 8kg | 0.8g | | | 8kg |
| 9kg | 0.9g | | | 9kg |
| 10kg | 1.0g | | | 10kg |
| 11kg | 1.1g | | | 11kg |
| 12kg | 1.2g | | | 12kg |
| 13kg | 1.3g | | | 13kg |
| 14kg | 1.4g | | | 14kg |
| 15kg | 1.5g | | | 2 包 |
| 16kg | 1.6g | 16kg | | |
| 17kg | 1.7g | 17kg | | |
| 18kg | 1.8g | 18kg | | |
| 19kg | 1.9g | 19kg | | |
| 20kg | 2.0g | 20kg | | |
| 21kg | 2.1g | 21kg | | |
| 22kg | 2.2g | 22kg | | |
| 23kg | 2.3g | 23kg | | |
| 24kg | 2.4g | 3 包 | 3 カプセル | |
| 25kg | 2.5g | | | 25kg |
| 26kg | 2.6g | | | 26kg |
| 27kg | 2.7g | | | 27kg |
| 28kg | 2.8g | | | 28kg |
| 29kg | 2.9g | | | 29kg |
| 30kg | 3.0g | | | 30kg |
| 31kg | 3.1g | | | 31kg |
| 32kg | 3.2g | | | 32kg |
| 33kg | 3.3g | | | 4 包 |
| 34kg | 3.4g | 34kg | | |
| 35kg | 3.5g | 35kg | | |
| 36kg | 3.6g | 36kg | | |
| 37kg | 3.7g | 37kg | | |
| 38kg | 3.8g | 38kg | | |
| 39kg | 3.9g | 39kg | | |
| 40kg | 4.0g | 40kg | | |
| 41kg | 4.1g | 41kg | | |
| 42kg | 4.2g | 5 包 | 5 カプセル | |
| 43kg | 4.3g | | | 43kg |
| 44kg | 4.4g | | | 44kg |
| 45kg | 4.5g | | | 45kg |
| 46kg | 4.6g | | | 46kg |
| 47kg | 4.7g | | | 47kg |
| 48kg | 4.8g | | | 48kg |
| 49kg | 4.9g | | | 49kg |
| 50kg | 5.0g | | | 50kg |

【効能・効果】

〈適応菌種〉

アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、肺炎クラミジア(クラミジア・ニューモニエ)、マイコプラズマ属

〈適応症〉

咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、中耳炎

【用法・用量】

小児には、**体重 1 kg あたり 10mg(力価)を 1 日 1 回、3 日間経口投与する。**

ただし、**1 日量は成人の最大投与量 500mg(力価)を超えないものとする。**

※ 15kg 未満の患児にはアジスロマイシン細粒小児用を投与すること。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

- (1) 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認すること。
- (2) 外国の臨床における体内動態試験の成績から、本剤 500mg(力価)を 1 日 1 回 3 日間経口投与することにより、感受性菌に対して有効な組織内濃度が約 7 日間持続することが予測されているので、治療に必要な投与期間は 3 日間とする。
- (3) 4 日目以降においても臨床症状が不変もしくは悪化の場合には、医師の判断で適切な他の薬剤に変更すること。(本剤の添付文書の「3. 相互作用」(3)の項参照)

◆詳細につきましては、必ず添付文書をご参照ください◆

☆アジスロマイシン細粒小児用 10% 「JG」

1g 中 日局 アジスロマイシン水和物 104.8mg 含有 (アジスロマイシンとして 100mg(力価))

※分包品は 1g

☆アジスロマイシンカプセル小児用 100mg 「JG」

1 カプセル中 日局 アジスロマイシン水和物 104.8mg 含有 (アジスロマイシンとして 100mg(力価))