

説明文書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	ロキソプロフェン錠「JG」									
2	成分・分量	1回量（1錠）中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg（無水物として60mg）									
3	用法・用量	症状があらわれた時、次の量になるべく空腹時をさせて水又はお湯で服用してください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td><td>1錠</td><td>2回まで。 ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。（服用間隔は4時間以上おいてください。）</td></tr> <tr> <td>15歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください。</td></tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	1錠	2回まで。 ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。（服用間隔は4時間以上おいてください。）	15歳未満	服用しないでください。	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人（15歳以上）	1錠	2回まで。 ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。（服用間隔は4時間以上おいてください。）									
15歳未満	服用しないでください。										
4	効能・効果	○頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児 (4) 医療機関で次の治療を受けている人 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、心臓病 (5) 医師から赤血球数が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等の血液異常（血液の病気）を指摘されている人 (6) 出産予定日12週以内の妊婦 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用前後は飲酒しないでください。 4. 長期連続して服用しないでください。 (3～5日間服用しても痛み等の症状が繰り返される場合には、服用を中止し、医師の診療を受けてください) 5. 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 気管支ぜんそく、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病の診断を受けた人 (7) 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、血液の病気にかかったことがある人 6. 1～2回服用しても症状がよくならない場合（他の疾患の可能性も考えられる）は服用を中止し、添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。									
6	薬剤師が必要と判断する事項	保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります） (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。									

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



販売元
日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号



製造販売元
長生堂製薬株式会社
徳島市国府町府中92番地